



29 de novembro de 2020

Empresa Solicitante:

Riole Eletrônica Ltda
Rua Luiz Andreta, 209
Atuba/Colombo-PR

EMYGDIO B. CARNEIRO

Gerente Comercial
+55 (41) 3256-1986
ecarneiro@riole.com.br

Referente: **LAUDO TÉCNICO AÇÃO VIRUCIDA**

Vimos por meio desta enviar os resultados dos testes virucidas *in vitro* realizados por este laboratório.

1) Produto:

- **Plataforma Desinfecção UV CLEAN MAT®**
- 2 lâmpadas com tecnologia UV-C**

Data Chegada: 22/10/2020

2) Vírus testado: Coronavírus cepa MHV gênero Betacoronavirus (mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2/COVID19, MERS e outros).

3) Procedimento experimental:

a) Os ensaios *in vitro* foram realizados em laboratório NB-2 (Biosafety Level 2) seguindo as metodologias descritas nas normas EN14476:2019 e Instituto Robert Koch - RKI (Alemanha) e obedecendo as Boas Práticas de Laboratório (BPL).

O meio de cultura para vírus e linhagens celulares foi utilizado o Meio Essencial Mínimo de Dulbecco (DMEM) contendo 10% de soro fetal bovino.

b) A titulação dos vírus foi realizada de acordo com o método DICC₅₀ (Doses Infectantes de Cultivos de Célula 50%). Diluições sequenciais do vírus na base 10 foram realizadas em quadruplicata, em microplacas 96 orifícios estéreis. A seguir foram adicionadas as células permissivas com uma concentração de 2 x 10⁵ células/orifício. Após 48 hs verifica-se o efeito citopático (ECP) da infecção viral, em comparação com controle celular e controle viral.

LAUDO VIRUCIDA

29 de novembro de 2020

- c) Inicialmente foi realizada a “Determinação da Concentração Máxima não tóxica (CMNT)” nas diferentes células testadas, para determinar a concentração que não causa toxicidade para as células. Pois as substâncias testadas devem ser ativas somente contra o vírus e não às células.
- d) No equipamento **UV CLEAN MAT® foram** distribuídas PLACAS DE PETRI de forma invertida com 0,5 ml de vírus (100DICT) embebido num papel filtro e distribuídas em diferentes posições e tempos de contato com UVC (08 e 15 segundos).
- e) As microplacas de 96 orifícios com 100 µL de vírus + os diferentes tempos de contato (submetidas a luz UVC), foram homogeneizadas e diluídas com meio de cultura DEMEM. Em seguida 100 µL de célula (2×10^5 células/orifício) foi pipetada sobre a suspensão e incubadas a 37°C em Estufa com 5% de CO₂ durante 48 horas a cinco dias.
- f) Após 48 horas de incubação as placas foram lidas através de Microscópio Ótico Invertido na busca do Efeito Citopático característico do vírus (verifica-se a falta ou não do efeito citopático (ECP) da infecção viral) e os títulos foram calculados com base no método de Reed and Muench, 1938.

Os resultados são expressos em percentual inativação viral (Tabela 1) em comparação com o controle viral (título do vírus) não tratado.

Resumo/controles:

- Negativo: controle células (2×10^5 células/mL) em meio DMEM, sem vírus e sem amostra teste.
- Controle de vírus: Titulação de vírus (10^1 a 10^{10}) e cultura de células em meio DMEM
- Teste positivo: presença de vírus, **cada amostra teste** e linhagens celulares em meio DMEM.

Tabela 1 - Os resultados são expressos em percentual inativação viral em comparação com o controle viral não tratado

Log de Redução	Fator de Redução	Percentual de Inativação/Redução Atividade
1	10	90%
2	100	99%
3	1000	99,9%
4	10.000	99,99%
5	100.000	99,999%
6	1.000.000	99,9999%

<https://microchemlab.com/information/log-and-percent-reductions-microbiology-and-antimicrobial-testing>

29 de novembro de 2020

4) Resultados:

Tabela 2 - Resultados *in vitro* da ação do equipamento “**UV CLEAN MAT®**” e tempos de contato sobre Coronavírus (Cepa MHV-3).

EQUIPAMENTO-UVC	Placas/ TEMPOS	Resultados em percentual Atividade (tabela 1) Coronavírus-MHV
	08 segundos	99,9% de inibição
UV CLEAN MAT®	15 segundos	99,9% de inibição

5) Conclusões:

- O equipamento **UV CLEAN MAT®** testado *in vitro* inibiu o grupo Coronavírus nos tempos de contato de 08 e 15 segundos
- Considerando que houve inibição de 99,9%, pode-se concluir que **UV CLEAN MAT®** foi eficaz para a inibição de partículas virais, e, portanto, recomendamos para o combate do grupo Coronavírus e para a COVID-19.



Profª Drª Clarice Weis Arns (ID Lattes: 8635038112182716)

Responsável pelo Laudo

LAUDO VIRUCIDA

29 de novembro de 2020

Bibliografia Consultada:

ANVISA - Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 2 DE JULHO DE 2013
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/int0004_02_07_2013.html

ANVISA- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 – ANVISA.
<https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-no-12-2016-anvisa/>
<https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-in-no-50-de-3-de-dezembro-de-2019-anvisa/>

BS EN 16777:2018: Chemical disinfectants and antiseptics. Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area

BS EN 14476:2013+A2:2019

Incorporating corrigendum August 2019
Chemical disinfectants and antiseptics -Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)

DIN EN 14476:2015. Chemical disinfectants and antiseptics. Virucidal quantitative suspension test for chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine. Test method and requirements [phase 2, step 1].
Brussels 2015, CEN-Comité Européen de Normalisation.

Britta Becker, Lars Henningsen, Dajana Paulmann, Birte Bischoff, Daniel Todt , Eike Steinmann, Joerg Steinmann, Florian H. H. Brill and Jochen Steinmann
Evaluation of the virucidal efficacy of disinfectant wipes with a test method simulating practical conditions
Antimicrobial Resistance and Infection Control (2019) 8:121
<https://doi.org/10.1186/s13756-019-0569-4>

G. Kampf D., Todt, S. Pfaender , E. Steinmann
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents
Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246e251
<https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022> 0195-6701

Rabenau HF, Schwebke I, Blumel J, Eggers M, Glebe D, Rapp I, Sauerbrei A, Steinmann E, Steinmann J, Willkommen H, Wutzler P.
Guideline of the German Association for the Control of Virus Diseases (DVV) e.V. and the **Robert Koch-Institute (RKI)** for testing chemical disinfectants for effectiveness against viruses in human medicine. Version of 1st December, 2014.
Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2015;58: 493–504

Reed LJ, Muench H.
A simple method of estimating fifty per cent endpoints. Am J Hyg. 1938; 27:493–497.